

La rougeole Measles

Qu'est-ce que la rougeole?

La rougeole est une maladie grave causée par le virus de la rougeole.

La rougeole peut provoquer l'encéphalite, une inflammation du cerveau qui peut entraîner des convulsions, la surdité ou des lésions cérébrales. Une personne atteinte de la rougeole sur 3 000 peut mourir de complications. Les complications et les décès sont plus fréquents chez les nourrissons de moins de 12 mois et chez les adultes.

Les complications de la rougeole peuvent inclure :

- Des infections de l'oreille (1 cas sur 10)
- La diarrhée (8 cas sur 100)
- La pneumonie (1 cas sur 10)
- Une hospitalisation (1 à 2 cas sur 10)
- L'encéphalite (environ 1 cas sur 1 000)

Grâce à la vaccination, la rougeole est maintenant une maladie rare au Canada. La plupart des cas surviennent chez des personnes qui n'ont pas été vaccinées, parmi lesquelles celles qui visitent le Canada et ont voyagé à l'étranger.

Existe-t-il un vaccin contre la rougeole?

Deux vaccins disponibles en Colombie-Britannique permettent de s'immuniser à la rougeole :

1. Le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR)
2. Le vaccin contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle (RORV)

Ces vaccins sont offerts gratuitement dans le cadre de la vaccination routinière des enfants et à ceux qui ont besoin d'être protégés contre la rougeole. Pour plus d'informations, consultez [HealthLinkBC File n° 14a Le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole \(ROR\)](#) et

[HealthLinkBC File n° 14e Le vaccin contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle \(RORV\).](#)

Comment la rougeole se transmet-elle?

La rougeole est très contagieuse et se propage facilement. Quand une personne infectée respire, tousse ou éternue, le virus se propage dans l'air. Il peut survivre pendant plusieurs heures dans l'air, dans des gouttelettes. Vous risquez d'être infecté lorsque vous respirez ces gouttelettes ou touchez des objets contaminés par le virus. La propagation aérienne du virus de la rougeole rend la maladie très contagieuse. Partager de la nourriture, des boissons ou des cigarettes, ou embrasser une personne porteuse du virus, peut également vous mettre en danger.

Quels sont les symptômes?

Les symptômes de la rougeole sont la fièvre, la toux, le nez qui coule et les yeux rouges, enflammés et souvent sensibles à la lumière. Ces symptômes sont suivis d'une éruption cutanée, qui commence d'abord sur le visage et le cou, puis se propage à la poitrine, aux bras et aux jambes, et dure environ 4 à 7 jours. De petites taches blanches peuvent également apparaître à l'intérieur de la bouche.

Ces symptômes peuvent se manifester à partir du septième jour qui suit l'infection par le virus de la rougeole.

Que faire si j'ai été exposé au virus de la rougeole?

Si vous avez été exposé au virus de la rougeole et n'avez jamais contracté cette maladie auparavant ou n'avez pas reçu 2 doses du vaccin contre la rougeole, vous devriez vous faire vacciner pour prévenir la maladie. Le vaccin doit vous être administré dans les 72 heures qui suivent l'exposition, afin que vous soyez immunisé contre le virus de la rougeole. Les personnes nées avant

1970 n'ont pas besoin de se faire vacciner, car elles ont probablement déjà eu la rougeole.

Si le vaccin ne peut être administré à temps ou s'il n'est pas recommandé que vous receviez ce vaccin, de l'immunoglobuline peut vous être prescrite pour votre protection. L'immunoglobuline contient des anticorps extraits de sang humain reçu par don. Les anticorps sont des protéines produites par le système immunitaire d'une personne pour lutter contre des germes, tels que les virus ou les bactéries. L'immunoglobuline administrée dans les 6 jours suivant l'exposition au virus de la rougeole peut protéger contre l'infection par la rougeole ou réduire la gravité de la maladie. Pour plus d'informations, consultez [HealthLinkBC File n° 63 L'immunoglobuline](#).

Que dois-je faire si je pense avoir la rougeole?

Si vous avez de la fièvre et une éruption cutanée et pensez que vous avez contracté la rougeole, d'autant plus si vous avez été en contact avec une personne atteinte de la rougeole ou si vous avez voyagé dans une région où une épidémie de rougeole sévit, faites-vous examiner par un fournisseur de soins de santé. Il est préférable de téléphoner à l'avance afin que vous puissiez être vu rapidement et sans infecter d'autres personnes. La rougeole peut se propager facilement dans des endroits comme les salles d'attente et les salles d'urgence. Le médecin ou l'infirmière de triage peut assurer que votre examen est effectué dans une zone fermée et à un moment où la salle d'attente de la clinique est vide. Apportez votre carnet de vaccination avec vous. Un examen physique et un test sanguin seront effectués. Un échantillon prélevé dans la gorge ou un échantillon d'urine sera recueilli. Ceci permettra de diagnostiquer, ou non, la rougeole.

Comment puis-je empêcher la propagation de la rougeole à d'autres?

Une personne atteinte de la rougeole risque de transmettre le virus à d'autres personnes, de 4 jours avant la première apparition d'éruption cutanée à 4 jours après. Si vous avez la rougeole, vous pouvez aider à prévenir la propagation à d'autres en :

- restant à la maison pendant au moins 4 jours après que l'éruption cutanée est apparue;
- vous lavant les mains régulièrement;

- toussant ou en éternuant dans un mouchoir ou votre manche plutôt que dans vos mains;
- ne partageant pas de nourriture, de boissons ou de cigarettes, et en n'embrassant pas d'autres personnes.

Quel est le traitement à domicile?

Après avoir consulté un fournisseur de soins de santé, les conseils de traitement à domicile suivants peuvent vous aider à être plus à l'aise pendant que vous vous reposez et que vous vous rétablissez.

- Buvez beaucoup de liquides, tels que de l'eau, du jus et de la soupe, surtout si vous avez de la fièvre.
- Prenez beaucoup de repos.

En cas de fièvre ou de douleur, on peut donner de l'acétaminophène ou du Tylenol^{MD}. Il ne faut PAS donner d'AAS ou d'aspirine aux moins de 20 ans, en raison des risques de syndrome de Reye.

Pour en savoir plus sur le syndrome de Reye, consultez la fiche [HealthLinkBC n° 84 Le syndrome de Reye](#).

Pour de plus amples informations sur les vaccinations, consultez ImmunizeBC à www.immunizebc.ca.

Pour les autres sujets traités dans les fiches HealthLinkBC, visitez www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ou votre unité de santé publique locale.

Pour obtenir des renseignements sur la santé et des services de santé non urgents, cliquez sur www.HealthLinkBC.ca ou composez le 8-1-1 en C.-B.

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent obtenir de l'aide en composant le 7-1-1 en C.-B.

Des services de traduction dans plus de 130 langues sont disponibles sur demande.



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority