

Le vaccin contre le tétanos, la diphtérie et la polio (Td-IPV)

Tetanus, Diphtheria and Polio (Td-IPV) Vaccine

Protégez votre enfant. Faites le vacciner à temps.

S'il est vacciné à temps, votre enfant sera protégé toute sa vie contre de nombreuses maladies.

La vaccination a sauvé plus de vies au Canada au cours des 50 dernières années que toute autre mesure sanitaire.

Qu'est ce que le vaccin Td-IPV?

Le vaccin Td-IPV protège contre les maladies suivantes :

- le tétanos,
- la diphtérie,
- la polio.

Le vaccin est approuvé par Santé Canada et est administré gratuitement. Appelez votre professionnel de santé pour prendre un rendez-vous.

Qui doit recevoir le vaccin Td-IPV?

Le vaccin Td-IPV est administré aux enfants à partir de 7 ans, qui ont besoin d'une dose de rappel contre le tétanos et la diphtérie et, également, d'être protégés contre la polio.

Il est important de conserver des preuves de toutes les vaccinations reçues.

Quels sont les avantages du vaccin Td-IPV?

Le vaccin Td-IPV est le meilleur moyen de se protéger contre le tétanos, la diphtérie et la polio, maladies graves et qui peuvent être mortelles.

Lorsque vous êtes vacciné, vous contribuez également à protéger les autres.

Quelles sont les réactions potentielles au vaccin?

La vaccination est très sécuritaire. Il vaut mieux se faire vacciner que de contracter le tétanos, la diphtérie ou la polio.

Les réactions les plus courantes au vaccin incluent douleur, gonflement et rougeur du bras au point d'injection.

En cas de fièvre ou de douleur, on peut donner de l'acétaminophène ou du Tylenol^{MD}. Il ne faut PAS donner d'AAS ou d'aspirine aux moins de 20 ans, en raison des risques de syndrome de Reye.

Pour en savoir plus sur le syndrome de Reye, consultez la fiche [HealthLinkBC File n° 84 Le syndrome de Reye](#).

Il est essentiel de rester à la clinique pendant un quart d'heure après la vaccination, car il existe un risque très rare d'une réaction allergique appelée anaphylaxie pouvant être fatale. Elle se manifeste par de l'urticaire, de la difficulté à respirer, une enflure de la gorge, de la langue ou des lèvres. Si vous présentez de tels symptômes après avoir quitté la clinique, appelez le **9-1-1** ou le numéro local des services d'urgence. Cette réaction peut être traitée et affecte moins d'une personne sur un million qui reçoivent le vaccin.

Il est essentiel de signaler toutes les réactions sévères ou inattendues à votre professionnel de santé.

Qui ne doit pas recevoir le vaccin Td-IPV?

Parlez à votre professionnel de santé si vous avez déjà eu une réaction allergique potentiellement mortelle à une dose de vaccin contre le tétanos, la diphtérie ou la polio, ou à un des composants du vaccin comme la néomycine ou la polymyxine B.

Les personnes qui ont développé le syndrome de Guillain-Barré (SGB) dans les 8 semaines suivant une vaccination contre le tétanos, sans qu'on ait pu déterminer une autre cause, ne doivent pas recevoir le vaccin Td-IPV. Le SGB est une maladie rare qui entraîne de la faiblesse et une paralysie des muscles. Elle apparaît le plus souvent après une infection, mais, dans de rares cas, peut survenir après certaines vaccinations.

Il n'est pas nécessaire de retarder une vaccination à cause d'un rhume ou d'une autre maladie bénigne. Cependant, si vous avez des inquiétudes, parlez-en avec votre professionnel de santé.

Que sont le tétanos, la diphtérie ou la polio?

Le **tétanos**, maladie connue aussi sous le nom de trismus (mâchoires bloquées), est causé par une bactérie qui se trouve surtout dans la terre. Lorsque la bactérie pénètre dans la peau par une coupure ou une écorchure, elle produit un poison qui peut entraîner une crispation douloureuse des muscles sur tout le corps. C'est très grave lorsque les muscles respiratoires sont affectés. Le tétanos est mortel dans environ un cas sur cinq.

La **diphtérie** est une grave infection du nez et de la gorge causée par la bactérie de la diphtérie. La bactérie se propage par voie aérienne par la toux ou les éternuements, et par contact direct avec la peau. La maladie peut entraîner de très graves problèmes respiratoires. Elle peut aussi entraîner une défaillance cardiaque et une paralysie. La diphtérie est mortelle dans environ un cas sur dix.

La **polio** est une maladie causée par une infection à virus. Alors que dans la plupart des cas d'infections de polio il n'y a pas de symptôme, d'autres cas peuvent entraîner une paralysie des bras ou des jambes voire la mort. La paralysie survient dans environ 1 cas sur 200 d'infection par le virus de la polio. La polio peut se transmettre par le contact

avec les selles (excréments) d'une personne infectée. Ceci peut survenir à l'occasion de la consommation d'aliments ou d'eau contaminés par des excréments.

Les cas de tétanos, diphtérie et polio sont devenus rares en C.-B. du fait des programmes de vaccinations systématiques des enfants.

Consentement d'une personne mineure dotée de maturité d'esprit

Il est conseillé aux parents ou aux tuteurs de discuter du consentement à la vaccination avec les enfants. Avant l'immunisation, on s'efforce d'abord d'obtenir le consentement d'un parent, d'un tuteur ou d'un représentant. Toutefois, les enfants de moins de 19 ans capables de comprendre les avantages et les réactions possibles en relation avec chaque vaccin, ainsi que les risques de ne pas se faire vacciner, peuvent légalement consentir aux immunisations ou les refuser.

Pour de plus amples informations sur les vaccinations, consultez Immunize BC, à www.immunizebc.ca.

Pour les autres sujets traités dans les fiches HealthLink BC, visitez www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ou votre unité de santé publique locale.

Pour obtenir des renseignements sur la santé et des services de santé non urgents, cliquez sur www.HealthlinkBC.ca ou composez le **8-1-1** en C.-B.

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent obtenir de l'aide en composant le 7-1-1 en C.-B.

Des services de traduction dans plus de 130 langues sont disponibles sur demande.



ImmunizeBC



BC Centre for Disease Control
An agency of the Provincial Health Services Authority