

Les vaccins recommandés en C.-B.

Vaccines recommended in B.C.



POUR LES ADULTES

VPH

- Vaccin recommandé jusqu'à 45 ans, pour les personnes en santé ou immunodéprimées.
- Gratuit si la 1ère dose est faite entre 9 et 20 ans et la 2ème dose avant 26 ans.(inclus)
- Le vaccin est également pris en charge de 9 à 45 ans
 - pour les hommes cisgenres ainsi que les personnes bispirituelles, transgenres et/ou non binaires.
 - pour les personnes vivants avec le VIH.
 - et celles qui ont reçu un traitement post-colposcopie pour dysplasie cervicale le 31 juillet 2025 ou après.

COQUELUCHE

- Il est recommandé de faire au moins un rappel au cours de sa vie adulte.
- Payant sauf si vous faites partie des 2 points suivants:
- Vaccin recommandé à chaque grossesse pour les femmes enceintes.
- Vaccin recommandé pour les personnes n'ayant pas reçu toutes leurs doses ou pour celles ne connaissant pas leur histoire vaccinale.

ZONA

- Recommandé dès 50 ans, même aux personnes ayant eu ou été vaccinées contre la varicelle ou avec le vaccin vivant contre le zona.
- Payant

PNEUMOCOQUES CONJUGUÉS

- Vaccin recommandé pour les + de 65 ans et les personnes fragiles.
- Gratuit.

GRIPPE

- Recommandé pour tous les + de 18 ans, tous les ans avant la saison de la grippe et en particulier ceux ayant des risques particuliers (grossesse, maladies chroniques, prestataires de soins de santé et personnes en contact avec des patients à risque ou en maison de soins pour personnes âgées, les personnes en contact avec des enfants de moins de 5 ans ainsi que les personnes agissant comme premiers répondants pour les services communautaires.)
- Gratuit pour tous.

TETANOS/DIPHTÉRIE

- Vaccin unique Td, recommandé tous les 10 ans. Gratuit.
- Peut être proposé dans les 5 ans si blessure à risque.
- Recommandé si l'histoire vaccinale n'est pas connue.

VRS (VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL)

Recommandé pour:

- les + de 75 ans,
- ou dès 60 ans pour les personnes résidant dans des maisons de retraite et d'autres établissements de soins de longue durée
- pour les femmes enceintes entre la 32ème et 36ème semaine de grossesse

Payant.

RATTRAPAGES VACCINAUX POSSIBLES

- Si schéma vaccinal incomplet par rapport à celui proposé en Colombie-Britannique
- Si l'histoire vaccinale de la personne n'est pas connue.