

Les vaccins recommandés en C.-B.

Vaccines recommended in B.C.



POUR LES ENFANTS ET LES ADOS

2 MOIS

- Vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la polio et l'*Haemophilus influenzae* de type b (DTaP-HB-IPV-Hib)
- Vaccin conjugué contre le pneumocoque (PCV 20)
- Vaccin conjugué contre le méningocoque C
- Vaccin contre le rotavirus

6 MOIS

- Vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la polio et l'*Haemophilus influenzae* de type b (DTaP-HB-IPV-Hib)
- Vaccin contre l'hépatite A (pour les enfants autochtones seulement)

12 MOIS

- Vaccin conjugué contre le pneumocoque (PCV 20)
- Vaccin conjugué contre le méningocoque C
- Vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR)
- Vaccin contre la varicelle

ENTRE 4 ET 6 ANS

- Vaccin contre le tétanos, la diphtérie, la coqueluche et la polio (Tdap-IPV)
- Vaccin contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle (RORV)

14 ANS (9ÈME ANNÉE)

- Vaccin conjugué quadrivalent contre le méningocoque
- Vaccin contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche (Tdap)

4 MOIS

- Vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'hépatite B, la polio et l'*Haemophilus influenzae* de type b (DTaP-HB-IPV-Hib)
- Vaccin conjugué contre le pneumocoque (PCV 20)
- Vaccin contre le rotavirus

6 MOIS ET +

- Vaccin contre la grippe (annuel) Une deuxième dose est nécessaire 4 semaines après la première si vous recevez le vaccin pour la première fois.

18 MOIS

- Vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la polio et l'*Haemophilus influenzae* de type b (DTap-IPV-Hib)
- Vaccin contre l'hépatite A (pour les enfants autochtones seulement)

11 ANS (6ÈME ANNÉE)

- Vaccin contre le virus du papilloma humain